

## Fiche mesure

### Implants prothétiques mammaires

#### 1. Contexte

Des recommandations de l'INCA ont été formulées sur l'ablation des implants mammaires en cas de lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à un implant mammaire (LAGC-AIM). Cette affection est extrêmement rare (18 cas diagnostiqués de 2011 à 2015).

#### 2. Recommandations de l'INCA (Avis du 4 mars 2015)

Après l'établissement du diagnostic de LAGC-AIM, il est nécessaire de réaliser :

- un bilan d'extension du lymphome par un hématologue
- un signalement obligatoire à l'ANSM
- une discussion de la conduite à tenir en RCP.

Le traitement consiste en une explantation avec capsulectomie totale et le cas échéant, une explantation contralatérale. Une réimplantation de prothèse mammaire n'est pas recommandée. Des traitements complémentaires (chimiothérapie, radiothérapie) peuvent être nécessaires selon le stade de la maladie.

#### 3. Prise en charge des ablations d'implants mammaires par l'Assurance Maladie

Les ablations d'implants mammaires sont prises en charge conformément aux indications de la CCAM et nécessitent une demande d'accord préalable.

Il est proposé d'inclure la notion de LAGC-AIM à la note d'indication de ces actes, réalisés avec capsulectomie, conformément aux recommandations de l'INCA, pour permettre la prise en charge du lymphome anaplasique à grandes cellules dans ce cadre.

Code	Libellé
16.06.08	<b>Ablation et changement d'implant prothétique mammaire</b> <i>Indication : chirurgie réparatrice</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>
QEGA003	<b>Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie</b> <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose, <b>lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant mammaire [LAGC-AIM]</b></i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>
QEGA004	<b>Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie</b> <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose, <b>lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant mammaire [LAGC-AIM]</b></i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>

Conformément aux recommandations de l'INCA, cette note d'indication ne sera pas intégrée aux notes :

- des actes de changement d'implant prothétique mammaire, la réimplantation n'étant pas recommandée en cas de LAGC-AIM
- aux ablations d'implant sans capsulectomie, une capsulectomie totale étant nécessaire en cas de LAGC-AIM.

