

Fiche mesure

Toxine botulique dans muscle strié

1. Contexte :

Avis HAS :

- 13 janvier 2010 concernant le BOTOX
- 07 novembre 2012 concernant le DYSPORT :

Extension d'indication au traitement de la spasticité des membres inférieurs chez l'enfant à partir de 2 ans

2. Propositions

Il est proposé une :

- Extension d'indication au traitement de la spasticité des membres inférieurs chez l'enfant à partir de 2 ans à la place de 12 ans.
- Harmonisation des deux libellés.

Code, libellé et notes initiaux

PCLB002

Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection

À l'exclusion de :

- séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001)
- injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901)
- injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001)

Indication : torticolis spasmodique [dystonie cervicale], traitement symptomatique local de la spasticité des membres

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale

Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé

PCLB003

Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection

Indication : torticolis spasmodique [dystonie cervicale], traitement symptomatique local de la spasticité des membres

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale

Code, libellé et notes modifiés

PCLB002

Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection

À l'exclusion de :

- séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001)
- injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901)
- injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001)

Indication : torticolis spasmodique [dystonie cervicale], traitement symptomatique local de la spasticité des membres

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale

Facturation : enfant de plus de 2 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé.

PCLB003

Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection

"À l'exclusion de :

- séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001)
- injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901)
- injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001)"

Indication : torticolis spasmodique [dystonie cervicale], traitement symptomatique local de la spasticité des membres

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale

Facturation : enfant de plus de 2 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé.